

ASSOCIATIONS RADIO- CHIMIOTHÉRAPIQUES

ETAT DES PRATIQUES AU SEIN DU GSF

RÉSULTATS:

QUESTIONNAIRES ENVOYÉS: 21
 QUESTIONNAIRES RENSEIGNÉS: 13 + 1

IGR (C Le Péchoux)	Centre F Baclesse (DLerouge)
CHU Marseille (X Muracciole)	Centre A Lacassagne Nice (J Thariat)
ICO Nantes (A Mervoyer)	CHU Amiens (A Coutte)
ICM Montpellier (C Llacer)	I Bergonié (P Sargos)
I Curie (S Helfre)	Centre L Berard Lyon (MP Sunyach)
IPC Marseille (L Moureau)	Centre O Lambret (A Cordoba)
ICR Toulouse (M Delannes)	IC Lorraine (G Vogin)

DONNÉES GÉNÉRALES

- Nombre de patients irradiés pour sarcome en 2014
 - par centre: 5-118
 - moyenne: 54p
 - 0.005-0.04% des traitements
- Techniques:
 - RCMI: 5-100%
 - Moyenne RCMI 66%
- Doses
 - pré-op: 50
 - post-op R0: 50 (54-60)
 - post-op R1: 60 (30% 66)

TRAITEMENTS ADJUVANTS

3/14 jamais de chimiothérapie hors essai

11 autres: 5 à 20% des patients traités par chimiothérapie adjuvante (moyenne 10%)

- Critères de sélection:
 - Grade: critère pour 100% des centres
 - Type histo
 - Marges, qualité de chirurgie, âge: critère pour 50% des centres
- Mode d'administration
 - Séquentiel préférentiel : 7 centres, chimio (4 à 6 cycles Adri Holoxan(6 centres), ou Adri mono (3 centres)), puis radiothérapie
 - Conco
 - préférentiel: 3 centres. CI: topo proximale, proximité OAR
 - conco ou séquentiel: 1 centre
 - 3 autres exceptionnellement
 - 2 sans Adri ou avec dose d'Adri réduite
 - total 4 à 5 cycles, dont 2 pendant RTE
- Délai chir-chimio 21 à 60 j (médiane 28j)
chimio-RTE 10 à 30j (médiane 28j)

TRAITEMENTS NEO-ADJUVANTS

- Critères de sélection:

- Grade (8/14)
- Rapidité d'évolution ou Tumeur inextirpable (8/14)
- Taille (7/14)
- Type histo (6/14)
- Préservation fonctionnelle, R1 programmé
- Lambeaux de couverture ou pontage programmés

- Type de traitement:

- RTE seule: 13 (1 à 50% +++10%)
- Chimio seule: 11 (1 à 35% +++10%) Adri-Holoxan ou Adri mono
- RTE+Chimio : 3 (dont 1 uniquement si pas de réponse sous chimio) Adri -Holoxan ou Adri mono, Platine -VP16: 2 cycles per, 3 à 4 au total

Délai bilan post traitement: 15 à 40j (+++28j)
RTE-chirurgie 30 à 60j (médiane 40j)
chimio-chirurgie: 21 à 45j (+++30j)
radio-chimio-chirurgie: 30à 60j