

## Information des patients sur leur traitement par anticancéreux par voie orale : De retour au domicile, que reste-t-il comme données ?

J.Lehrer(1), M.Grouvel(1), A.Zogo(1), E.Balladur(2), L.Havard(1), B.Mittaine-Marzac(1)

(1) Service de Pharmacie (PUI), Hospitalisation A Domicile Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP)

(2) Médecin coordonnateur, Hospitalisation A Domicile Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP)

### Introduction :

**Plan Cancer 2014-2019** : recommandation sur l'information de l'ensemble des acteurs de soins et les patients sur le traitement par anticancéreux par voie orale (AKVO) → limiter la survenue des effets indésirables et améliorer l'observance grâce à une **meilleure coordination ville/hôpital**.

- Mais **de retour au domicile**, que retiennent les patients comme information et que souhaitent-ils améliorer ? Une étude a été réalisée auprès des patients adultes hospitalisés à domicile (HAD).


### Patients et méthodes :

- Etude prospective entre le 22 mai et le 8 juin 2018 pour **tous les patients adultes** recevant un AKVO et admis à l'HAD-APHP.
- **Médecins coordonnateurs** détectaient le jour du staff, les patients traités par AKVO et relevaient les **items relatifs au traitement** (indication, date de début de traitement, conduite à tenir en cas d'effet indésirable, etc...) à partir d'un support élaboré par la PUI de l'HAD.
- **2ème questionnaire destiné aux patients** sur l'existence de supports d'information et le niveau de savoir perçu par le patient. Les réponses étaient obtenues par téléphone par un pharmacien.

### Résultats :

#### • Médecins coordonnateurs :


- **12/14 Unités de Soins (US) ont participé à l'étude**
- **23 patients traités par AKVO** signalés parmi les 502 admis sur les 12 US
- **87% prescriptions hospitalières** (dont 85% d'un service d'onco-hématologie)
- Pour **17.4%** des patients, la **date de début de traitement** par AKVO n'était pas connue par l'HAD
- Dans **91.3%** des cas, la conduite à tenir en cas **d'effets indésirables** n'était pas précisée
- **Indication AKVO (Détail Figure 1) :**
  - 47,8% cancer hématologique
  - 52,2% tumeurs solides



**Figure 1 : Nombre de patients traités par AKVO par indication N=23**

#### • Patients

- **Taux de participation de 61%** : 14/23 patients ont répondu au questionnaire proposé (7 sans réponses, 2 refus)
- Age médian [Min-Max] : 72 ans [26-84] // 11 Hommes (47,8%)



**Figure 2 : Perceptions et souhaits des patients sur les informations reçues sur leur traitement AKVO N=14**

### Conclusion :

- Effectif de patients limité mais résultats suggèrent une **diffusion et une appropriation limitée** des informations sur les AKVO (structure et patients).
- Point de vue des patients = **plus d'implication** des soignants intervenants au domicile.
- Etude complétée par un recueil directement auprès des soignants au domicile et des médecins hospitaliers → obtenir les données de **tous les intervenants** du circuit