

# **Comportements des personnels hospitaliers et étudiants vis-à-vis du tabagisme : une enquête transversale au CHU de Lyon**

Abstract ID : 5029

Soumis par : Stéphanie LAMA Le 2019-04-15 15:33:50

Nommage interne selon la nomenclature personnalisée :

Nom de la catégorie : Parcours patient - Prévention, dépistage, diagnostic

Catégorie secondaire :

Typologie : Poster

Statut : validé

Autorisation de diffusion : Yes/Oui

---

## Introduction :

Le tabac est le premier facteur de risque évitable de mortalité. Les comportements des soignants vis-à-vis du tabagisme sont controversés dans la littérature et il n'existe que peu de données. En France, les comportements tabagiques de la population générale sont évalués régulièrement par les enquêtes baromètre Santé. L'objectif de cette enquête était de mesurer la prévalence du tabagisme parmi les personnels hospitaliers et les étudiants des HCL. Les objectifs secondaires étaient d'identifier les facteurs associés au tabagisme actif.

## Méthode :

Il s'agit d'une enquête prospective, mono-centrique, de type enquête de prévalence, menée par questionnaire papier un jour donné. Tous les personnels rémunérés par les HCL et présents le jour de l'enquête étaient éligibles. De même, tous les étudiants régulièrement inscrits en formation initiale dans l'une des facultés, écoles et instituts du CHU de Lyon et présents le jour de l'enquête étaient éligibles. Les questionnaires étaient relus par lecture optique. L'analyse a été réalisée avec SPSS avec utilisation d'un modèle de régression logistique uni- puis multivariée limitée aux variables pertinentes.

## Résultats :

Au total, 3325 questionnaires étudiants ont été analysés et 6387 questionnaires personnels, soit un taux de participation de 41% et 52% respectivement. La prévalence du tabagisme actif était sensiblement inférieure parmi les personnels et les étudiants comparés à la population générale, dans les deux sexes et dans toutes les classes d'âge à l'exception des 18-24 ans. Les facteurs significativement associés à un tabagisme actif dans le personnel sont : le sexe masculin (OR 1.33 [1.097-1.613] – P=0.004) ; l'âge de moins de 25 ans (OR 1.71 [1.304-2.252] – P<0.0001) ; le fait d'appartenir à la catégorie C de la fonction publique (OR 1.87 [1.510-2.310] – P=0.004) ; le fait de travailler de nuit (OR 1.5 [1.233-1.820] – P<0.0001). Chez les étudiants, l'âge inférieur à 25 ans et les études paramédicales (vs. médicales) sont deux facteurs significativement associés au tabagisme actif. De même, dans les deux groupes, l'utilisation de la cigarette électronique est significativement associée au tabagisme actif.

Discussion/Conclusion : La prévalence du tabagisme est plus faible chez les personnels hospitaliers et étudiants en santé par rapport à la population générale sauf chez les moins de 25 ans.

Cette étude permet d'identifier au sein du personnel et des étudiants les groupes à risque de tabagisme actif et de mieux cibler la politique de prévention à travers une prise en charge coordonnée entre professionnels hospitaliers engagés dans la lutte contre le tabagisme ( pneumologues, addictologues, médecins du travail...), dont le COLT ( Comité de Lutte contre le Tabagisme) constitue l'instance de pilotage .

---

Mots clefs :

Auteurs :

Références : , , ,

## Auteurs

**SEBASTIEN COURAUD 1,**

1. Pneumologie aigue spécialisée et cancérologie thoracique, HCL Groupement Hospitalier Sud, Pierre Bénite, FRANCE

## Auteurs (raw format)

COURAUD SEBASTIEN - email : sebastien.couraud@chu-lyon.fr Etablissement : HCL Groupement Hospitalier Sud Service : Pneumologie aigue spécialisée et cancérologie thoracique Ville : Pierre Bénite Pays : FRANCE Présentateur : Oui

