


Les OPTIMISATIONS deviennent...

GYNAIX OPTIS

Vendredi
27 janvier 2017

CENTRE DES CONGRÈS
D'AIX-EN-PROVENCE





La contraception définitive

Dr Anaïs Ladaïque
Centre Hospitalier du Pays d'Aix

- met un terme définitif à la procréation
- couramment utilisée pour les femmes ou homme du monde entier
- 220 millions de couples dans le monde
- 600 000 ligatures de trompes chaque année aux États-Unis. 20% des femmes mariées
- commodité, facilité d'utilisation et peu d'effets secondaires
- aucun coût continu ou examens médicaux
- Cycle menstruel non perturbé
- Pas d'influence sur la sexualité, les sécrétions hormonales

Permanent contraception for women. Micks EA, Jensen JT, - Womens Health (Lond) - November 1, 2015; 11 (6); 769-77

Complications

- Mortalité: très faible : 2 à 6/100000 cas

(Etude américaine de Peterson et al entre 1977 et 1981):

complications de l'AG, infections (voie vaginale),
hémorragies (voie coelioscopique)

- Morbidité : faible

Lésions vasculaires ou viscérales lors de l'introduction du
trocart ou de l'aiguille. (Chapron)

Brûlures intestinales

ECHECS

REGRETS

Cadre légal

- Loi du 4 juillet 2001
 - Personne majeure, volonté libre, motivée et délibérée
 - Après information claire et complète
 - Praticué dans un établissement de santé
 - Après une consultation auprès d'un médecin
 - 1^e consultation : informer des risques médicaux et des conséquences, remettre un dossier d'information écrit
 - Délai réflexion 4 mois
 - Signer feuille consentement
 - Confirmation écrite
- > *Score de Lerat*


Techniques

variété de techniques : sûres et efficaces


- Coélioscopie
- Mini laparotomie post partum
- Au cours d'une césarienne
- Voie vaginale
- Hystéroscopie



Coelioscopie



Technique bien maitrisée, rapide
2 petites incisions
taux stérilisation proche 100%




Risque coelioscopie
et anesthésie : faible
mais peu acceptable

Laparotomie


ou
Minilaparotomie

Ligature-section tubaire selon
Pomeroy



Ligature des trompes post-partum:

- Dans les 72 heures suivant l'accouchement
- petite incision transversale infraombilicale.
- un taux de complications proche de celui de la stérilisation à intervalles
- Coélioscopie à éviter



Voie vaginale



A travers le fornix vaginal postérieur

BUT: éviter l'incision abdominale

COLPOTOMIE, ouverture cul de sac
ou par endoscopie CULDOSCOPIE

Sous A.L. ou A.G.

taux plus élevés de complications et d'échec



pas en post-partum

GYNAIX
OPTIS


Hystéroscopique

1. Essure 2002

moins invasive
mais nécessite délai et
imagerie

À 3 mois

100 000 procédures







2. bouchons Silastic placés sous guidage hystéroscopique.
technique en cours de développement stérilisation réversible











CI essure

Doute sur le désir
suspicion grossesse
post partum ou post abortum immédiat
infection pelvienne (salpingite)
métrorragies inexpliquée ou suspicion néoplasie
cavité utérine anormale avec ostiums
inaccessibles
allergie au nickel (principe de précaution)


Réalisation pose essure







Contrôle radiologique




→ Vérifier :

- La présence des 2 implants.
- La symétrie de forme.
- La distance entre les 2 parties proximales des implants doit être inférieure à la longueur de l'implant.
- L'alignement des 4 marqueurs.


→ La radiographie doit être analysée par le chirurgien qui a posé les implants.



Base données
PMSI



BAYER A-T-IL COMMERCIALISÉ UN SYSTÈME DE CONTRACEPTION DANGEREUX ?



de stérilisation
es femmes
renoncer pour

7 à 19:05

0



BFMTV



REPLAY



EMISSIONS

Les implants contraceptifs de Bayer: le nouveau scandale sanitaire?

 **Harmonie mutuelle** 1^{re} mutuelle santé de France. [MON DEVIS EN LIGNE](#)

SANTÉ - SCIENCES

Implants Essure: près de 200 plaignantes veulent le retrait de ce contraceptif définitif

© 19/01/2017 à 11h26

Scandale des implants Essure : "On m'a prise pour une folle" témoigne

sion...
plainte
d.

/2016 10:59

NAIX
OPTIS




Contreverse Essure



- Pétition 73000 signatures en France
- 1000 plaintes aux USA
- règles hémorragiques, dyspareunie, fatigue, douleurs pelviennes, douleurs dorsales, musculaires, perforations d'organes, réactions allergiques, auto-immunes
- groupe Facebook «EssureProblems » aux Etats-Unis, association Resist en France
- Essure placé sous surveillance renforcée par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament)
- Arrêté du 5 février 2016
- Délégation reçue par le directeur du cabinet de la ministre de la santé

Vasectomie



Dans le monde entier 100 millions d'hommes
Echec <1%

taux de grossesses après vasectomie 1/800
La quantité de sperme éjaculé n'est pas diminuée

Technique : isoler le déférent chirurgicalement
le couper, le coaguler et/ou l'occlure

méthode très efficace
peu onéreuse

Poursuivre contraception 12 semaines

Complications précoces (hématome, infection, granulome, orchépididymite, épидидymite congestive) surviennent dans 1-6% des cas

Ligatures trompes ou vasectomie?

- Taux d'échec vasectomie 1 / 1200 contre 1/ 200 pour la LT
- Coût LT est de 5 à 6 x celui d'une vasectomie
- Mortalité masculine = 0

Entre 10 et 14 femmes meurent chaque année (aux États-Unis) de la ligature des trompes

- Stérilisation féminine souvent sous AG - Stérilisation masculine sous AL
- La vasectomie devrait être recommandée à des couples désirant une "contraception" permanente et non réversible. Comparée à la ligature tubaire bilatérale
- Lorsque la vasectomie est inappropriée pour une raison quelconque, la ligature des trompes demeure un excellent choix pour la contraception chirurgicale permanente

*Vasectomie et chirurgies contraceptives déférentielles : aspects légaux et techniques, Prog Urol, 2007, 17, 789-793
(Permanent Female Sterilization (Tubal Ligation) Gary R. Newkirk Pfenninger and Fowler's Procedures for Primary Care, Chapter 152, 1033-1043*



Merci de votre attention

GYNAIX
OPTIS